

新型コロナウイルスワクチン接種

## ファイザー社製ワクチンの予約一時停止について



令和3年10月15日  
郡山市新型コロナウイルス  
ワクチン接種プロジェクトチーム  
担当：松田 信三  
TEL：924-2222

SDGs ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」

ファイザー社製ワクチンにつきましては、予定されたワクチンの供給が完了することから、個別接種医療機関の予約を一時停止いたします。

なお、大規模接種会場でのモデルナ社製ワクチンの接種予約については、現在も受付しています。

### 1 ファイザー社製ワクチン

- (1) 予約受付期限 令和3年10月22日（金）
- (2) 予約及び接種場所 各個別医療機関

### 2 モデルナ社製ワクチン

令和3年10月28日（木）正午まで、または受付予定人数に達するまで予約受付中です。

- (1) 予約方法 ①インターネット予約

<https://area34.smp.ne.jp/area/switch/0000260007FKBH0B6b/resLoginSwitching>



市予約サイト  
QRコード

- ②電話予約

0120-567-362（市専用予約ダイヤル）

⇒ 受付は午前8時30分から午後5時15分まで（※平日のみの受付）

- (2) 接種場所 星総合病院（メグレスホール）

- (3) その他 モデルナ社製ワクチンの10代及び20代男性の接種者において、心筋炎や心膜炎が疑われる副反応の報告頻度が高いという傾向が確認されています。

市では対象者の方に対し、接種前の予診時に別紙（厚生労働省ホームページに記載されているQ&A）を使用し、ワクチン接種後の心筋炎や心膜炎の情報をお伝えした上で接種を実施しています。

なお、今後、10代及び20代男性への接種において、ファイザー社製ワクチンが推奨された場合には、対応するワクチンを適切に供給するよう国に要望しています。

### 3 今後について

ファイザー社製ワクチンの予約受付再開については、医療機関の予約受付状況や在庫状況を確認したうえで、あらためてお知らせします。

## Q ワクチンを接種すると心筋炎や心膜炎になる人がいるというのは本当ですか。

| NEW |

**A** mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン接種後、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎あるいは心膜炎になったという報告がなされています。軽症の場合が多く、心筋炎や心膜炎のリスクがあるとしても、ワクチン接種のメリットの方がはるかに大きいと考えられています。

海外において、頻度としてはごく稀ですが、新型コロナワクチンの接種後に起こった症状として、心筋炎・心膜炎の事例が報告されています。特に、1回目よりも2回目のmRNAワクチン接種後に、高齢者よりも思春期や若年成人に、女性よりも男性に、より多くの事例が報告されています。国内でも、件数は稀ではあるものの、副反応を疑う事例として同様の報告がみられています。

ワクチン接種後に、心筋炎・心膜炎を疑う事例が国内外で報告されていることについて、新型コロナウイルス感染症の発生状況も踏まえ、心筋炎・心膜炎の専門家は以下のような見解を示しています。

- ・コロナ禍においては、心不全・不整脈・冠動脈疾患などの心血管病の診断と管理が重要であり、若年者であっても胸部の症状(胸の痛みや違和感、息切れなど)があれば、精査や治療の継続が必要です。
- ・ワクチン接種後に心筋炎や心不全が疑われた報告の頻度やその重症度、突然死の報告頻度よりも、COVID-19感染後のそれらの発症頻度は高く、重症です。
- ・医学的見地から、心血管合併症の発症、重症化の予防及び死亡率の減少を図るためにも、ワクチン接種は有効であると考えます。
- ・コロナ禍においても、ワクチン接種歴の有無に関わらず、突然死のリスクである心血管病を早期発見するために、胸部の症状の出現など心血管疾患が疑われる時には、速やかに近くのかかりつけ医などに相談し、必要に応じて精査や治療をすることが重要です。

心筋炎や心膜炎の典型的な症状としては、ワクチン接種後4日程度の間、胸の痛みや息切れが出ることが想定されます。特に若年の男性の方は、こうした症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診することをお勧めします。

なお、日本で接種が進められているmRNAワクチンについて、接種後に副反応を疑う事例として報告された心筋炎や心膜炎の状況を解析した結果、接種された人の属性がワクチンの種類ごとに異なることに留意が必要であるものの、ファイザー社のワクチンでは20代男性の報告頻度が他の年代に比べて高く、武田/モデルナ社のワクチンでは10代及び20代男性の報告頻度が高いという傾向が確認されています。

### 心筋炎・心膜炎が疑われた報告頻度 (100万人接種当たり)

年齢(歳)	ファイザー社		武田/モデルナ社	
	男性	女性	男性	女性
10~19	1.87	1.94	21.60	0.00
20~29	13.08	1.45	17.06	0.79
30~39	2.88	1.45	2.57	2.81

(注) 1回目接種後の報告と2回目接種後の報告の合計(令和3年10月1日報告時点)

※ この表は、最新の審議会で評価された数値に基づき作成していますが、若年者の接種が進むに従い、数値が変化していくことに留意が必要です。

厚生労働省の審議会では、このような解析結果について議論を進めつつも、「国内外の報告によると、若年者において、COVID-19感染症により心筋炎を合併する確率はワクチン接種後に心筋炎を発症する確率と比較して高いこと等も踏まえ、現時点においては、接種によるベネフィットがリスクを上回っており、若年男性も含め、全体として、ワクチン接種体制に直ちに影響を与える程の重大な懸念は認められない」旨の評価がなされています。

国内外では、医療機関から副反応を疑う事例が幅広く収集されており、これまでワクチンと因果関係があると考えられていなかった症状も含めて、幅広く評価が行われた結果、このような知見が得られてきました。引き続き、国内外の最新の情報を注意深く収集し、皆様にお知らせしてまいります。

(参考資料)

[一般社団法人日本循環器学会提出資料](#) (第62回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会)

[心筋炎関連事象の報告頻度](#) (第69回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第18回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会資料より抜粋)

[CDC: ACIP Presentation Slides: June 23-25, 2021 Meeting](#)

## 新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 (フリーダイヤル)

**0120-761770**

### 対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語

ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

### 受付時間 (土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分～21時00分

タイ語 9時00分～18時00分

ベトナム語 10時00分～19時00分

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

法人番号6000012070001

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(代表)

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved.