

新型コロナウイルスワクチン接種情報

**新型コロナワクチン未接種の市民の方向けの  
集団接種予約を再度受付します！**



令和4年1月6日  
郡山市新型コロナウイルス  
ワクチン接種プロジェクトチーム  
室長 松田 信三  
TEL：924-2222

SDGs ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」

新型コロナワクチンを一度も接種していない市民の方への接種機会確保のため、今年2回目となる集団接種予約の受付を行います。

1 接種概要

接種場所	接種日時	
	1回目接種	2回目接種
郡山市保健所 (1階：多目的ホール)	①令和4年1月14日(金) 14時00分 ②令和4年1月21日(金) 14時00分 ③令和4年1月28日(金) 14時00分 <b>※定員：各日20名(計60名)</b>	令和4年2月25日(金) ・14時15分(定員20名) ・14時30分(定員20名) ・14時45分(定員20名)

2 対象者

郡山市に住民登録がある新型コロナワクチン未接種の方

3 予約受付開始および予約方法

(1) 予約受付開始

**令和4年1月7日(金) 午前8時30分から**

※定員に達した段階で受付を終了します。

(2) 予約受付方法

<電話予約のみ>

・市予約専用ダイヤル(0120-567-362)

⇒ 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで

4 使用ワクチン

モデルナ社製ワクチン

5 その他

- ・1回目接種日にかかわらず、2回目接種日は2月25日(金)となりますのでご注意ください。
- ・2回目の接種時間帯については、予約空き状況に応じてオペレーターが指定します。
- ・10代及び20代男性の方は、別紙「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について」の内容をご確認のうえ、予約を行ってください。

## 10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ



## 新型コロナウイルスワクチン接種後の 心筋炎・心膜炎について

ファイザー社と武田／モデルナ社の新型コロナウイルスワクチン接種後に、ごくまれに、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。特に10代・20代の男性の2回目の接種後4日程度の間が多い傾向があります。


### ■ 10代・20代の男性も、引き続きワクチンの接種をご検討ください。

- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも、心筋炎・心膜炎になることがあります。感染症による心筋炎・心膜炎の頻度に比べると、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎になる頻度は低いことがわかっています。
- 新型コロナウイルスワクチンは、発症予防効果などの接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をおすすめしています。しかしながら、ワクチン接種は、あくまでご本人の意思に基づき受けていただくものです。ご本人が納得した上で、接種をご判断ください。

### ■ 10代・20代の男性は、ファイザー社のワクチンの接種も選択できます。

- 10代・20代の男性では、武田／モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。
- 武田／モデルナ社のワクチンを予約中の方も、武田／モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種した方も、ファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約を取り直していただければ、ファイザー社のワクチンを受けられます。
- なお、ご本人または保護者が希望する場合には、武田／モデルナ社のワクチンを受けることもできます。

#### 〈 心筋炎・心膜炎が疑われた報告頻度の比較（男性） 〉



出典:第70回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第19回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和3年10月15日開催)資料

ワクチン接種後4日程度の間に胸の痛み、動悸(どうき)、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

- こうした症状は、心筋炎・心膜炎の典型的な症状です。ただし、そのほかの原因でもこれらの症状となることがあります。医師の診察を受けましょう。
- 心筋炎・心膜炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

〈 日本国内の10代・20代で、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎が疑われた報告頻度 〉  
(ワクチンを受けた100万人あたり)

年齢	男性		女性	
	ファイザー社	武田／モデルナ社	ファイザー社	武田／モデルナ社
12～19歳	3.7	28.8	2.2	0.0
20～29歳	9.6	25.7	1.1	1.4

※1回目接種後と2回目接種後の報告の合計値より算定(令和3年10月15日報告時点)

**Q:10代・20代の男性以外でも武田／モデルナ社ワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が多いのでしょうか。**

A:令和3年10月15日時点における解析では、10代・20代男性以外の報告頻度については、ワクチン間に差はありません。  
最新の値や他の年代の報告頻度は、ホームページをご覧ください。

厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A:

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0079.html> ➔



**Q:若者はワクチンを打たない方がよいということでしょうか。**

A:日本で接種が行われている新型コロナワクチンは、いずれも、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、重症化を予防する効果も報告されています。海外だけでなく、実際に日本において感染が拡大した時期でも、若者の感染者の増加が確認されており、引き続き若者に対してもワクチンの接種をおすすめしています。

新型コロナワクチンの詳しい情報については、  
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



**ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。**

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

具体的には、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。