

「こおりやまの米」通信

令和6年9月



GOOD RICE DAY
毎月8日は
こおりやま「お米の日」



編集:郡山市

JA福島さくら郡山統括センター (TEL.024-921-0503)

NOSAI福島中央支所 (TEL.024-933-3307)

県中農林事務所農業振興普及部 (TEL.024-935-1310)

発行:郡山市農作物生産対策協議会

(郡山市園芸畜産振興課 TEL.024-924-3761)

毎月8日は『こおりやま「お米の日」』
豊かな自然と気候に恵まれた、県内一の
米どころである郡山の美味しいお米を
食べましょう！

生育状況速報(9月3日現在)

こおりやまの米通信

検索



1 生育状況

各調査ほ場の生育状況は表1のとおりです。同じ品種でも、移植時期などの違いによりばらつきがありますので、あくまでも参考としてください。

平年よりも出穂が5日程度早く、登熟期間中の気温も高かったため、成熟期は平年より7～10日程度(昨年と同程度)早まり、出穂の早いほ場では収穫期を迎えています。



表1 成熟期調査結果

品種	地区	移植日	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)
コシヒカリ	田村	5月4日	90.6 (100)	17.0 (94)	365 (105)
コシヒカリ	三穂田	5月13日	91.5 (94)	16.8 (93)	404 (98)
コシヒカリ	富久山	5月15日	95.0 (105)	19.3 (103)	298 (103)
コシヒカリ	日和田	4月30日	98.2 (100)	19.4 (104)	316 (77)
ひとめぼれ	熱海	5月20日	79.6 (90)	19.0 (103)	418 (106)
ひとめぼれ	喜久田	5月13日	85.6 (98)	18.5 (98)	381 (93)
天のつぶ	三穂田	5月14日	81.7 (107)	17.4 (92)	463 (111)
ふくひびき	喜久田	5月27日	76.9 (98)	19.0 (92)	301 (87)
里山のつぶ	湖南	5月18日	89.8 (108)	18.8 (102)	441 (99)
直播天のつぶ	喜久田	5月11日	81.8 (105)	19.6 (110)	361 (80)

* () 内は平年比 (%)

2 今後の管理

各品種の刈り取り時期は、表2の積算気温の到達日を参考にしてください。なお、今後の天候も高温が見込まれ、到達日が更に早まることが予想されるため、ほ場を良く観察し、籾黄化率80～90%、穂軸の黄化50%、籾水分25%を目安に刈り始めてください。品質低下防止のため、積算気温1200℃到達までに収穫を終えるよう、早めに収穫を開始してください。気温が高い条件下での刈り遅れは胴割粒の発生を増加させるため、刈り遅れとならないよう、余裕を持った刈り取り計画としてください。

刈取・乾燥・調製の留意点については、「こおりやまの米」通信(Vol.7)を参考にしてください。

表2 出穂後の積算気温による刈り取り適期の目安

地域	主な品種の 平均的な出穂期		9月3日までの 積算気温 (℃)	各積算気温の到達日			
				950℃	1000℃	1050℃	1200℃
				刈り取り始めの目安			刈り取り晩限
平坦部	ひとめぼれ	7月28日	984	9月2日	二	二	9月13日
	天のつぶ	8月1日	875	二	9月9日	二	9月18日
	コシヒカリ	8月5日	766	二	9月14日	9月16日	9月24日
湖南	あきたこまち	7月28日	923	9月5日	二	二	9月17日
	里山のつぶ	8月1日	825	9月9日	二	二	9月23日

※「各積算気温の到達日」は、9月3日までの実測値、それ以降は平年値で算出
平坦部はアメダス郡山のデータ、湖南はアメダス猪苗代のデータを使用

農業者の
皆様へ

- ・農作業事故に注意して作業しましょう！
- ・道路に泥を落とさないように注意しましょう！
- ・住宅に隣接する水田での爆音機の使用は控えましょう！
- ・稲わらは焼却せず、すき込みし、土づくりに活用しましょう！